
皮肤撕裂是痛苦的，但很大程度上是可以预防的

皮肤撕裂会发生在所有年龄层，也是医疗保健中的常见问题。ISTAP 网站提供了一系列有效的信息和方法，让您在家里或在任何医疗机构都可以预防和护理皮肤撕裂的问题。

在此，我们诚挚邀请您免费加入ISTAP 会员注册，在此，您可获得 有关皮肤撕裂的最新信息，以便改善患者的护理治疗效果。

请访问 www.skintears.org 并立即加入吧！

如果有查询请发邮件：
president@skintears.org



迈向一个没有皮肤撕裂的世界！

告别皮肤撕裂的世界



国际皮肤撕裂伤咨询小组 (ISTAP) 是一项跨专业合作组织。它致力于通过教育，研究和宣传来预防皮肤撕裂及并发症的发生、促进伤口愈合

。





简介

- 皮肤撕裂是急性伤口, 具有转变为复杂慢性伤口的高风险
- 具有关文献报道, 皮肤撕裂的患病率等于或大于压疮的患病率
- 虽然皮肤撕裂通常发生在老年人群, 但在危重病人, 儿科和早产新生儿中也会出现皮肤撕裂现象。
- 全方位的风险评估应包括评估个人的一般健康状况, 例如慢性/危重疾病史, 用药史, 病人的认知, 感觉, 视觉, 听觉和营养状况等等



可用管理指南

ISTAP 皮肤撕裂管理指南可以帮助您以及相关的医疗设施更好地管理皮肤撕裂

您可以使用的其他工具指南, 例如:

- 评估和治疗途径
- 风险评估途径
- 降低风险计划
- 决策方法



皮肤撕裂伤的分级

Type 1: No Skin Loss

Type 2: Partial Flap Loss

Type 3: Total flap loss



Linear or Flap Tear which can be repositioned to cover the wound bed

Partial Flap loss which cannot be repositioned to cover the wound bed

Total Flap loss exposing entire wound bed

STAR 分级系统是依据表皮损伤的形态学表现而将皮肤撕裂伤分成3大级别, 2 个亚级:1a 级: 伤口边缘可以复位到正常解剖位置(没有过度的伸展), 皮肤或皮瓣颜色不苍白、暗淡或发黑; 1b 级: 伤口边缘可以复位到正常解剖位置(没有过度伸展), 皮肤或皮瓣颜色苍白、暗淡或发黑; 2a 级: 伤口边缘不能复位到正常解剖位置, 皮肤或皮瓣颜色不苍白、暗淡或发黑; 2b 级: 伤口边缘不能复位到正常解剖位置, 皮肤或皮瓣颜色苍白、暗淡或发黑; 3 级: 皮瓣完全缺失。

ISTAP 积极参与全球的教育活动, 比如学术会议和研讨会, 并立志于促进预防和治疗皮肤撕裂的临床实践。2016 年, ISTAP 很荣幸地在两年一度的世界伤口愈合协会的会议上获得“最进步协会奖。与此同时, ISTAP 也发表了许多关于皮肤撕裂的文章, 包括: 皮肤撕裂: 科学现状: 预防, 预测, 评估和治疗皮肤撕裂的声明; 国际皮肤撕裂咨询小组: 将所有这些信息归纳为一个简单易懂的管理指南, 以用于提高预防, 评估和治疗皮肤撕裂; 最新的皮肤撕裂分类系统的验证; 2016 年 1 月, ISTAP 正式转名为加拿大官方利益集团肠造口治疗协会 (CAET)。